

# Stórdjóraæti í Hetlandsrennuni

Tvey sløg av ljóskrabba (krill) mynda í stóran mun nøgdirnar av stórdjóraæti (macrozooplankton) í Hetlandsrennuni, men eisini pílorimar (*Sagitta*) eru at finna í stórum nøgdum í økinum.

Av stórum djóraæti er tað serliga krill sum dominerar í økinum sunnan fyri Føroyar. Tíggju ymisk sløg av krill vórðu funnin, har serliga 2 sløg vóru at finna í stórum nøgdum í økinum. Hesi bæði sløgini eru sera ymisk til støddar. Annað slagið kallast *Meganyctiphanes norvegica* og kann blíva upp til 7 cm til longdar, meðan hitt slagið, *Thysanoessa longicaudata*, bert blívur uml. 1½ cm (Mynd 1).

Av øðrum stórum djóraæti vóru serliga pílorimar (*Sagitta* spp) at finna í stórum nøgdum í økinum.


Í verkætlanini, sum byrjaði í mai 2001 og endaði í juni 2003, vóru royndir tiknar á 3 støðum tvørtur um Hetlandsrennuna (Mynd 2).

## Nøgdir av djóraæti

Nøgdirnar av stórum djóraæti varieraðu nógv ígjøgnum árið. Nøgdirnar av krill var hægst um summarið og um veturin (Mynd 3). Um summarið vóru tað mest smærri krill, gýtt um várið, ið vóru funnin í royndunum. Um veturin var tað framvegis tann sama generatióin, sum domineraði í royndunum, men eftir at hava vaksið í nakrar mánaðar vóru tey blivin nakað størri.



**Mynd 1.** Tey bæði høvuðssløgini av krill sunnan fyri Føroyar. Ovast: *M. norvegica*. Niðast: *T. longicaudata*.



**Mynd 2.** Kort av havleiðunum kring Føroyar. Teir tríggir bláu rundingarnir í Hetlandsrennuni vísa hvar royndirnar vóru tiknar, og heiti á støðunum.

Nøgdirnar av pílorimum vóru meiri javnt høgur alt árið. Tó var mest av smáum pílorimum um summarið og stórum um veturin.

## Lívfrøðin hjá krill


Lívfrøðin hjá teimum báðum dominerandi sløgum av krilli í Hetlandsrennuni er lík. Tann yngsta generatióin, gýtt um várið, av *T. longicaudata* sást í royndunum longu í juni mánaði.

Ábendingar vóru eisini um, at *T. longicaudata* kanska gýtir í tveimum umfórnum í økinum sunnan fyri Føroyar, fyrru ferð um várið og seinnu ferð um summarið.

## Loddrætt ferðing



HØGNI H. DEBÉS  
LÍVFRØÐINGUR



Mynd 3. Nögd av krill pr. 1000 m<sup>3</sup> í Hetlandsrennuni.

Stórdjóraeti er kent fyri at ferðast upp og niður gjøgnum sjógvin (upp um náttina og niður um dagin). Okkara royndir vístu, at serliga *T. longicaudata*, og til ein vissan mun eisini *M. norvegica* og pílorimar, bera seg at á henda hátt.

meðan tað í teimum ovaru løgunum gongur í ein landnyrðing. Hetta merkir at stórdjóraetið verður ført í ein útsynning um dagin, tá tað er á djúpum vatni, meðan tað um náttina, tá tað er grynri í sjónum, verður ført mótsattan veg. Líkt er tí til, at stórdjóraeti heldur seg í økinum.

Mynd 4. Støddardiagram av *Thysanoessa longicaudata* í juni á teimum trimum støðunum í Hetlandsrennuni.

#### Vatnrætt rák av stórdjóraeti

Havstreymarnir í Hetlandsrennuni eru soleiðis, at á djúpum vatni, djúpari enn uml. 500 m, er rákið í ein útsynning,

